

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

RECORTE DOS INQUÉRITOS EPIDEMIOLÓGICOS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - 001/2017

Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (SVEA)

Vigilância das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (VigDCNT)

VIGITEL

**Recorte do Município do Rio de Janeiro
2006 a 2015**

VIGITEL

2006 a 2015

Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas
por Inquérito Telefônico

RECORTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO



Introdução:

A Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) é realizada pelo Ministério da Saúde, a partir de 2006, em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (NUPENS).

O inquérito acontece anualmente nas 26 capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal e tem por objetivo monitorar a frequência e a distribuição dos principais determinantes das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). São utilizadas amostras probabilísticas da população de adultos (≥ 18 anos de idade) que residem em domicílios servidos por, ao menos, uma linha telefônica fixa.

Este recorte (2006/2015) propõe divulgar dados relativos ao Município do Rio de Janeiro e a seleção dos temas considerou a importância para a determinação da carga total de doença estimada pela OMS para a região das Américas (WHO, 2005). Entre os fatores de risco, foram incluídos temas como: hábito de fumar, excesso de peso, consumo de refrigerantes, doces e alimentos fontes de gordura saturada, inatividade física, consumo de bebidas alcoólicas, além da referência ao diagnóstico médico de hipertensão arterial, diabetes e dislipidemias. Entre os fatores de proteção: a prática de atividade física no tempo livre e no deslocamento para o trabalho, o consumo de frutas e hortaliças e de feijão. Também foram selecionadas informações sobre a realização de exames para detecção precoce de tipos comuns de câncer em mulheres (mamografia e citologia oncológica para câncer de colo de útero).

Ressalta-se que os resultados deste inquérito subsidiam o monitoramento de algumas metas propostas no Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças, tanto para o nacional quanto para o estadual.

(Fonte: Vigitel, 2006 – 2015)

Indicador de Morbidade e seus Fatores de Risco/Proteção Fonte: VIGITEL	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
% de Adultos que Referem Diagnóstico Médico de Hipertensão Arterial	24,7	27,1	29,5	28,0	29,2	29,8	29,7	28,7	28,1	30,6
masculino	21,0	22,2	23,4	23,0	23,6	23,9	25,4	25,1	25,1	24,5
feminino	27,9	31,1	34,6	32,1	33,9	34,7	33,2	31,8	30,7	35,8
% de Adultos que Referem Diagnóstico Médico de Diabetes	5,9	5,6	6,7	6,4	8,7	6,2	7,8	7,4	9,2	8,8
masculino	4,7	4,9	5,1	5,2	5,5	7,3	7,1	7,1	7,4	7,7
feminino	6,9	6,2	8,0	7,4	11,3	5,3	8,4	7,7	10,7	9,6
% Adultos que Referem Diagnóstico Médico de Dislipidemia								19,7	20,4	20,7
masculino								16,4	17,6	16,2
feminino								22,4	22,7	24,4
% de Adultos com Excesso de Peso (Índice de Massa Corporal maior ou igual 25 kg/m²)	48,3	47,1	43,8	50,4	52,7	49,6	52,7	53,0	54,4	55,7
masculino	52,5	52,4	45,2	56,2	56,5	55,5	55,3	58,4	58,9	56,8
feminino	44,4	42,2	42,4	45,0	49,1	44,2	50,5	47,9	50,7	54,9
% de Adultos com Obesidade (Índice de Massa Corporal maior ou igual 30 kg/m²)	12,5	14,5	12,8	17,7	16,4	16,5	19,8	20,2	19,4	18,5
masculino	11,7	14,4	12,3	19,7	14,2	15,8	17,8	21,7	19,8	13,9
feminino	13,2	14,6	13,2	15,9	18,4	17,2	21,5	18,7	19,1	22,4
% de Adultos que Praticam Atividade Física Suficiente no Tempo Livre (pelo menos 150 minutos de atividade moderada na semana)	16,3	17,4	15,6	16,1	14,0	30,0	34,0	33,0	37,6	41,0
masculino	21,7	20,9	19,3	19,9	16,5	38,9	43,2	40,8	41,8	50,8
feminino	11,8	14,4	12,6	13,0	12,0	22,5	26,3	26,4	34,1	32,8
% de Adultos Fisicamente Ativos no Deslocamento						17,5	16,0	13,0	14,4	15,3
masculino						18,4	17,6	12,3	15,3	18,5
feminino						16,8	14,7	13,7	13,7	12,7
% de Adultos: com Prática Insuficiente de Atividade Física										43,7
masculino										32,3
feminino										53,3
% de Adultos Fisicamente Inativos	14,3	12,9	16,2	12,8	14,8	12,5	16,6	15,9	16,5	14,4
masculino	15,6	13,8	15,6	18,3	13,0	13,3	15,9	17,4	17,3	15,2
feminino	13,2	12,2	16,7	8,1	16,4	11,9	17,2	14,6	15,8	13,8
% de Adultos que Referem a Existência Perto de Sua Casa, de Lugar Público para Prática de Exercícios							76,9	76,1		
masculino							80,3	78,1		
feminino							74,0	74,5		
% de Adultos que Assistem TV por Três ou mais Horas Diárias	16,7			29,1	31,9	33,7	32,2	32,7	30,6	26,0
masculino	25,3			28,1	31,8	36,1	29,8	30,7	31,5	26,3
feminino	9,5			30,0	31,9	31,7	34,2	34,4	29,8	25,7
% de Adultos que Costumam Consumir Carnes com Excesso de Gordura	35,1	29,4	29,6	26,7	27,5	31,5	28,8	27,6	25,8	27,2
masculino	45,5	37,0	38,8	35,7	37,0	40,0	38,4	37,1	32,8	36,3
feminino	26,4	23,0	21,9	19,1	19,5	24,4	20,8	19,6	20,0	19,5

Indicador de Morbidade e seus Fatores de Risco/Proteção Fonte: VIGITEL	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
% de Adultos que Consomem Refrigerantes Cinco ou mais Dias por Semana (Consumo Regular)###	16,1	27,0	27,6	29,2	32,2	35,1	28,8	26,0	22,8	19,6
masculino	18,5	31,4	32,0	23,0	34,7	39,6	32,4	29,0	23,5	21,4
feminino	14,1	23,3	23,8	26,4	30,1	31,3	25,9	23,5	22,1	18,2
% de Adultos que Costumam Consumir Leite com Teor Integral de Gordura	52,2	49,7	51,4	57,4	54,5	51,9	49,3	48,0	48,5	46,6
masculino	57,5	57,5	57,0	61,5	60,5	54,8	53,8	51,9	54,4	54,7
feminino	47,8	43,2	46,7	53,9	49,4	49,5	45,6	44,7	43,6	39,8
% de Adultos que Consomem Frutas e Hortaliças, Cinco ou mais Dias por Semana (Consumo Regular)	29,9	29,8	30,3	31,9	29,3	30,3	32,5	33,1	36,8	38,5
masculino	20,9	20,8	21,3	24,9	24,6	22,9	23,9	26,0	29,9	31,6
feminino	37,4	37,3	37,8	37,8	33,1	36,5	39,7	39,1	42,6	44,4
% de Adultos que Consomem Cinco ou mais Porções Diárias de Frutas e Hortaliças (Consumo Recomendado)	9,1	14,0	20,0	20,2	18,2	19,9	21,6	22,2	24,7	27,8
masculino	6,8	8,0	14,4	16,8	15,4	14,3	16,2	18,5	19,7	24,3
feminino	11,1	19,0	24,7		20,6	24,5	26,2	25,3	28,9	29,1
% de Adultos que Consomem Feijão Cinco ou mais Dias por Semana				71,7	73,6	73,5	72,0	73,5	68,5	67,1
masculino				77,0	78,6	79,6	75,2	78,7	74,1	76,4
feminino				67,3	69,3	68,3	69,2	69,1	63,7	59,3
% de Adultos que Consideram seu Consumo de Sal Alto ou Muito Alto								14,8	12,4	14,1
masculino								18,0	15,4	13,9
feminino								12,1	9,9	14,3
% de Adultos que Consomem Alimentos Doces Cinco ou Mais Dias por Semana							22,0	19,4	17,9	23,1
masculino							20,9	16,4	15,1	19,0
feminino							23,0	21,9	20,3	26,6
% Adultos que Substituem Almoço ou Jantar por Lanches Sete ou mais Dias por Semana								20,0	19,7	17,4
masculino								12,0	16,9	12,0
feminino								26,7	22,0	21,9
% de Adultos Fumantes	14,5	16,1	16,6	13,5	13,3	14,1	13,5	11,8	10,5	12,5
masculino	16,1	16,7	19,0	15,6	13,4	15,5	17,1	15,1	10,8	14,6
feminino	13,2	15,6	14,6	11,8	13,3	12,9	10,5	9,0	10,2	10,8
% de Adultos que Fumam 20 ou mais Cigarros por Dia	5,1	6,1	6,0	4,7	5,4	5,5	5,2	4,1	3,1	4,2
masculino	6,6	6,3	7,7	5,2	5,9	5,1	6,0	6,2	4,4	6,5
feminino	3,8	5,9	4,5	4,3	5,0	5,8	4,5	2,4	2,0	2,3
% de Adultos Ex-fumantes	24,6	23,4	21,1	22,7	21,5	20,6	22,6	23,3		
masculino	31,3	28,4	25,9	25,6	24,0	24,4	26,4	24,6		
feminino	19,1	19,2	17,1	20,2	19,5	17,4	19,4	22,2		

Indicador de Morbidade e seus Fatores de Risco/Proteção Fonte: VIGITEL	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
% de Adultos Fumantes Passivos no Domicílio				13,6	12,8	11,1	8,7	9,5	8,7	9,1
masculino				14,5	10,9	7,5	8,0	10,2	9,9	9,5
feminino				12,9	14,4	14,0	9,2	9,0	7,7	8,8
% de Adultos Fumantes Passivos no Local de Trabalho				13,3	12,1	12,5	10,1	10,0	8,1	8,7
masculino				19,3	17,1	18,4	15,6	13,3	13,1	13,1
feminino				8,3	7,9	7,5	5,6	7,3	3,9	5,0
% de Fumantes Passivos em Casa e/ou no Trabalho							18,0	18,2		
masculino							22,7	21,7		
feminino							14,0	15,2		
% de Adultos com Consumo Abusivo de Bebidas Alcoólicas (nos últimos 30 dias, em uma mesma ocasião)	16,7	19,2	20,5	21,0	18,6	18,2	18,9	17,8	18,3	20,7
masculino (cinco ou mais doses)	25,3	27,2	28,6	29,3	25,3	25,4	25,6	26	25,6	28,2
feminino (quatro ou mais doses)	9,5	12,6	13,7	14,0	13,1	12,2	13,3	11,0	12,2	14,4
% de Adultos que Referem Dirigir Após Consumo de qualquer quantidade de Bebida Alcoólica						2,6	4,6	3,4	3,1	3,3
Masculino						5,0	8,9	6,5	5,8	6,2
feminino						0,5	1,0	0,8	0,8	0,9
% de Adultos que Costumam Dirigir Após Consumir Bebida Alcoólica Abusivamente em Relação aos que Dirigem							2,5	3,2		
masculino							3,6	4,0		
feminino							0,0	1,2		
% de Adultos que Costumam Dirigir Após Consumir Bebida Alcoólica Abusivamente em Relação aos que Bebem Abusivamente e Dirigem							10,3	12,0		
masculino							12,8	13,4		
feminino							0,0	6,2		
% de Adultos que Costumam Dirigir Após Consumir Qualquer Quantidade de Bebida Alcoólica em Relação aos que Dirigem							10,3	8,1		
masculino							12,9	10,2		
feminino							4,6	2,8		
% de Adultos que Costumam Dirigir Após Consumir Qualquer Quantidade de Bebida Alcoólica em Relação aos que Bebem e Dirigem		*	*	*	*	*	22,4	16,1		
masculino		*	*	*	*	*	25,4	19,0		
feminino		*	*	*	*	*	12,7	6,6		
% Adultos que Referem que Foram Multados por Dirigir com Excesso de Velocidade								3,0		
masculino								5,2		
feminino								1,2		

Indicador de Morbidade e seus Fatores de Risco/Proteção Fonte: VIGITEL	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
% Adultos que Referem que Foram Multados por Dirigir com Excesso de Velocidade na Cidade								2,0		
masculino								3,2		
feminino								1,0		
% de Adultos que Referem que Foram Multados por Dirigir com Excesso de Velocidade em Rodovia								0,8		
masculino								1,7		
feminino								0,0		
% de Adultos que Referem que Foram Parados em Alguma Blitz de Trânsito na sua Cidade								13,5		
masculino								21,1		
feminino								7,1		
% de Adultos que Avaliaram Negativamente o seu Estado de Saúde										5,2
masculino										3,4
feminino										6,8
% de Mulheres (50 a 69 anos de idade) que Realizaram Mamografia (em algum momento da vida)		76,0	80,0	83,1	77,8	81,3	85,8	85,6	87,3	88,0
% de Mulheres (50 a 69 anos de idade) que Realizaram Mamografia (nos últimos 2 anos)		62,7	64,9	69,3	60,9	67,2	72,0	75,2	75,2	75,8
% de Mulheres (25 a 64 anos) que Realizaram Exame de Citologia Oncótica para Câncer de Colo do Útero em algum momento da vida										84,4
% de Mulheres (25 a 64 anos) que Realizaram Exame de Citologia Oncótica para Câncer de Colo do Útero nos Últimos Três Anos							78,5	84,3	80,0	81,3

Observações:

Até a pesquisa de 2008, o indicador era nomeado como % consumo refrigerante não diet e considerava apenas os refrigerantes e sucos artificiais com açúcar. A partir da pesquisa de 2009, o indicador passou a ser nomeado como % consumo regular refrigerante e considera os refrigerantes de qualquer tipo e sucos artificiais.

* Nº de casos menor que 30, insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.

Fonte:

- MS/SVS/CGDANT - VIGITEL: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. em 10/01/2017.



Para mais informações contate a Área Técnica responsável.

Vigilância em Doenças Crônicas Não Transmissíveis:**Área Técnica**

Tel. /Fax: 55 (21) 2333-3853 e 2333-3879

Rua México, 128 – sala 406. Centro RJ. CEP: 20031-142

Técnica responsável pelo recorte da Informação:

Márcia Regina Mazalotti Teixeira

Técnica responsável pela edição:

Rosemary Paz de Barros