

Informe Epidemiológico 077/2017

Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde/Unidade de Resposta Rápida – CIEVS/URR

MONITORAMENTO DAS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA

FEBRE AMARELA

Julho/2017

MONITORAMENTO DA FEBRE AMARELA SILVESTRE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data da atualização: 26/07/2017

1. MONITORAMENTO DOS CASOS SUSPEITOS NO ERJ

O MS vem monitorando desde dezembro/2016 os casos de Febre Amarela Silvestre notificados em todo o país. Até 31 de maio de 2017, foram notificados ao Ministério da Saúde 3.240 casos suspeitos de febre amarela silvestre, desses, 519 (16%) casos permanecem em investigação, 792 (24,5%) casos foram confirmados e 1.929 (59,5%) foram descartados.

Segundo o MS é considerado caso suspeito de Febre Amarela:

“Indivíduos com quadro febril agudo (até 7 dias), de início súbito, acompanhado de icterícia e/ou manifestações hemorrágicas, residente ou procedente de área de risco para febre amarela ou de locais com ocorrência de epizootias em primatas não humanos ou isolamento de vírus em vetores, nos últimos 15 dias, não vacinado contra febre amarela ou com estado vacinal ignorado.”

Segundo estes critérios no período de janeiro a julho de 2017 foram notificados à SES/RJ 80 casos suspeitos de febre amarela silvestre.

Dos 80 casos notificados, 25 foram confirmados e 55 foram descartados. Dos 25 casos confirmados, 08 casos tiveram como Local Provável de Infecção (LPI) o município de Casimiro de Abreu, 05 o município de Macaé, 03 o município de Maricá, 02 o município de Porciúncula, 01 o município de Silva Jardim, 01 o município de São Fidélis, 01 o município de Santa Maria Madalena, 01 o município de Cachoeiras de Macacu, e 01 o município de Bom Jesus do Itabapoana localizados no estado do RJ, destes 08 evoluíram para óbito (02 Porciúncula, 02 Macaé, 01 Casimiro de Abreu, 01 Maricá, 01 Silva Jardim, e 01 Santa Maria Madalena). Os outros dois casos confirmados no ERJ tiveram como LPI o estado de MG, e foram identificados nos municípios de Rio de Janeiro e Nova Iguaçu. O descarte dos casos só foi realizado após exame laboratorial específico, com resultado negativo.

Os casos notificados possuem média e mediana de idade 38 e 35 respectivamente, sendo 64% (N=51) do sexo masculino e 36% (N=29) do sexo feminino. Quanto ao estado vacinal 21% (N=17) informaram ter realizado a vacina contra febre amarela, 56% (N=45) relatam não ter realizado a vacina contra febre amarela, os demais (23%) não possuem o registro desta informação na ficha de notificação. Importante ressaltar que 100% dos casos confirmados não possuem história de vacinação prévia contra

Febre Amarela.

Tabela 1 – Distribuição de casos de Febre Amarela investigados no ERJ – Janeiro a Julho de 2017.

Município de Residência	casos notif	Status da notificação		
		Invest	Conf	Desc
Araruama	2			2
Bom Jesus do Itabapoana	1		1	
Cabo Frio	4			4
Cachoeiras de Macacu	1		1	
Campos dos Goytacazes	7			7
Cantagalo	1			1
Conceição de Macabu	1			1
Casimiro de Abreu	17		7	10
Duque de Caxias	1			1
Italva	1			1
Itaperuna	1			1
Macaé	12		5	7
Maricá	2		1	1
Niterói	2		1***	1


Nova Iguaçu	2		1**	1
Nova Friburgo	3			3
Porciúncula	2		2	
Quissamã	1			1
Rio de Janeiro	5		1**	4
Rio das Ostras	2			2
Santa Maria Madalena	1		1	
São Fidelis	3		1	2
São Francisco do Itabapoana	3			3
São Gonçalo	1		1***	
São Pedro da Aldeia	1		1*	
Silva Jardim	2		1	1
Residentes de outros Estados	1			1
Total	80	0	25	55

Fonte: SVS/SVEA/CIEVS RJ. Dados atualizados em 26/07/2017, sujeitos à alteração.

*Caso com LPI em Casimiro de Abreu.

** Caso com LPI MG.

*** Caso com LPI em Maricá.

Figura 1 – Distribuição dos casos monitorados no ERJ por Semana Epidemiológica (SE).

Fonte: SVS/SVEA/CIEVS RJ. Nota: Não foi possível identificar a SE de 01 caso devido o mesmo não possuir data de início de sinais e sintomas. Dados atualizados em 26/07/2017, sujeitos à alteração.

2. VIGILÂNCIA AMPLIADA DA FEBRE AMARELA NO ERJ

Considerando o contexto apresentado e, visando tornar o sistema de vigilância epidemiológica ainda mais sensível, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro orienta os profissionais de saúde do ERJ que considerem para fins de notificação, a seguinte definição de caso suspeito de febre amarela:

2.1) Para área afetada ou ampliada

Indivíduos com quadro febril agudo (até 7 dias) acompanhado de dois ou mais sinais: cefaleia, mialgia, artralgia, vômito, dor abdominal, icterícia ou manifestações hemorrágicas e residentes ou procedentes, nos últimos 15 dias, de áreas afetadas* ou ampliadas.**

* Área afetada: constituída por municípios com evidência da circulação do vírus da FA, em casos humanos e/ou PNH.

**Área ampliada: municípios contíguos ou próximos à área afetada.

2.2) Para as demais áreas do estado

Indivíduo com quadro febril agudo (até 7 dias), de início súbito, acompanhado de icterícia e/ou manifestações hemorrágicas.

Municípios com casos em monitoramento ampliado: 28 municípios

Dos 104 casos suspeitos, 06 (6%) casos permanecem em investigação e 98 (94%) casos foram descartados.

Dentre os casos suspeitos 63% (N=66) são do sexo masculino e 37% (N=38) são do sexo feminino. A média e a mediana de idade foi de 39 e 38, respectivamente, tendo como limite mínimo 02 e o máximo em 78 anos.

Em relação à situação vacinal 26% (N=27) foram vacinados, 28% (N=29) não foram vacinados e 46% (N=48) não possuem o registro desta informação na ficha de notificação.

Tabela 2 – Distribuição dos casos de Febre Amarela em Monitoramento Ampliado no ERJ.

Município de Residência	Total de casos notif.	Status da notificação	
		Invest	Desc
ANGRA DOS REIS	3	1	2
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	1		1
BARRA DO PIRAÍ	4		4
B. JESUS DO ITABAPOANA	3		3
DUQUE DE CAXIAS	3	1	2
GUAPIMIRIM	1		1
IGUABA GRANDE	1		1
ITABORAÍ	3		3
ITAGUAÍ	1		1

ITAPERUNA	7		7
MACUCO	1		1
MARICÁ	2		2
NITERÓI	10	1	9
NOVA IGUAÇU	2		2
PIRAÍ	1		1
PETRÓPOLIS	2		2
PORCIÚNCULA	6		6
RESENDE	1		1
RIO BONITO	1		1
RIO DE JANEIRO	33	2	31
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	1		1
SÃO GONÇALO	7		7
SAPUCAIA	1		1
SAQUAREMA	1		1
SILVA JARDIM	1	1	
TRÊS RIOS	2		2
VALENÇA	2		2
VOLTA REDONDA	2		2
RESIDENTES DE OUTROS ESTADOS	1		1
TOTAL	104	06	98

Fonte: SVS/SVEA/CIEVS RJ. Dados atualizados em 26/07/2017, sujeitos à alteração.

3. IMUNIZAÇÃO

A vacinação contra a febre amarela (FA) é recomendada para onde a transmissão da doença é considerada possível, principalmente para indivíduos não vacinados e que se expõem em áreas de mata.

Atualmente, leste de Minas Gerais (MG), Estado do Espírito Santo (ES), oeste da Bahia e noroeste do Rio de Janeiro, além dos municípios no entorno de Casimiro de Abreu, São Sebastião do Alto e Campos dos Goytacazes, considerados como áreas afetadas no Estado do Rio de Janeiro, são locais com recomendação para vacinação.

Tabela 3 – Distribuição de doses de Vacina contra Febre Amarela Distribuídas no ERJ.

Município	Total de doses Distribuídas
Total Metropolitana I	3.003.320
Total Metropolitana II	736.860
Total Baixada Litorânea	526.760
Total Serrana	677.855
Total Centro Sul	247.270
Total Médio Paraíba	316.550
Total Norte	658.995
Total Noroeste	273.765
Total Baía da Ilha Grande	135.930
Estado do Rio de Janeiro	6.577.305

Fonte: SVS/SVEA/CIEVS RJ. Dados atualizados em 26/07/2017, sujeitos à alteração.

Tabela 4 – Total de doses de Vacina contra Febre Amarela aplicadas no ERJ.

Município	Total de doses aplicadas
Total Metropolitana I	1.909.405
Total Metropolitana II	529.275
Total Baixada Litorânea	409.415
Total Serrana	495.698
Total Centro Sul	149.747
Total Médio Paraíba	146.543
Total Norte	550.865
Total Noroeste	209.611
Total Baía da Ilha Grande	60.091
Estado do Rio de Janeiro	4.460.650

Fonte: SVS/SVEA/CIEVS RJ.

Dados atualizados em 26/07/2017, sujeitos à alteração.

4. MONITORAMENTO EPIZOOTIAS


Considera-se como epizootias segundo o MS “a ocorrência de um determinado evento em um número de animais ao mesmo tempo e na mesma região, podendo levar ou não a morte”.

Cenário Epidemiológico do ERJ:

Municípios com epizootias em investigação: 46

Municípios com Epizootias confirmadas*: 05

*As epizootias foram confirmadas através da técnica laboratorial RT_PCR e Imuno-histoquímica.



O ERJ tem realizado a vigilância ativa dos primatas. Essa estratégia tem objetivo avaliar e/ou monitorar áreas com presença de populações de primatas e/ou de vetores silvestres, para identificar áreas com circulação viral. Até o momento foram recolhidas amostras de primatas nos municípios de Paty do Alferes (n=2); Miguel Pereira (n=2), Vassouras (n=4), Angra dos Reis (n=8), Maricá (n=1), Parati (n=5) e Itatiaia (n=2).

Para mais informações contate o setor responsável.

Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde / Unidade de Resposta Rápida:

End: Rua México, 128 Sala 403 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ

Tel.: (21) 2333.3996 / 2333.3852 / 2333.3993

Plantão (24h): 98596-6553

E-mail: notifica@saude.rj.gov.br

Coordenadora: Silvia Cristina de Carvalho Cardoso