

SÍNDROME GRIPAL (SG) SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) INDICAÇÕES E NÃO INDICAÇÕES PARA QUIMIOPROFILAXIA

ATENÇÃO

A QUIMIOPROFILAXIA
INDISCRIMINADA ou
SEM CRITÉRIOS pode
promover o aparecimento
de RESISTÊNCIA VIRAL.

CONTATO SEM INDICAÇÃO PARA QUIMIOPROFILAXIA

- Exposição APÓS 48 horas com caso suspeito ou confirmado para **Influenza**;
- Vacinado contra **Influenza** há MAIS de 2 semanas (exceção: crianças menores de 5 anos e crianças entre 5 e 9 anos com comorbidades).

RECOMENDAÇÕES

LAVAGEM DAS MÃOS,
USO DE ÁLCOOL EM GEL,
USO DE ETIQUETA RESPIRATÓRIA.

CONTATO COM INDICAÇÃO PARA QUIMIOPROFILAXIA

- Pessoas com exposição há MENOS de 48 horas com caso suspeito ou confirmado para **Influenza**, considerando indicações abaixo:

Pessoa com RISCO PARA COMPLICAÇÃO:

- Não vacinada ou vacinada há menos de 2 semanas;
 - POPULAÇÃO INDÍGENA
 - GESTANTE EM QUALQUER TRIMESTRE GESTACIONAL;
 - PUÉRPERA (ATÉ 2 SEMANAS APÓS PARTO);
 - IDOSO A PARTIR DE 60 ANOS DE IDADE;
 - CRIANÇAS < 5 ANOS;
 - POPULAÇÃO INDÍGENA COM DIFICULDADES DE ACESSO
 - PESSOAS COM COMORBIDADES*



*COMORBIDADES:

PNEUMOPATIAS, TODAS AS FORMAS DE TUBERCULOSE, DOENÇAS CARDIOVASCULARES EXCETO HAS, DISTÚRBIOS METABÓLICOS INCLUINDO DM, TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS E DO DESENVOLVIMENTO QUE POSSAM COMPROMETER A FUNÇÃO RESPIRATÓRIA OU AUMENTAR O RISCO DE ASPIRAÇÃO, HIV/AIDS, NEOPLASIAS, IMUNOSSUPRESSÃO MEDICAMENTOSA, HEPATOPATIAS, NEFROPATIAS E OBESIDADE.

- **CRIANÇAS** não vacinados ou vacinados há menos de 15 dias, e que estiveram envolvidos com menos de 9 anos de idade com **comorbidades*** sem a segunda dose da vacina ou com menos de duas semanas após a segunda dose.
- **PROFISSIONAIS DE SAÚDE** não vacinados ou vacinados há menos de 15 dias, e que estiveram envolvidos na realização de procedimentos invasivos geradores de aerossóis ou na manipulação de secreções de caso suspeito ou confirmado de influenza sem o uso adequado de equipamentos de proteção individual (epi).
- **PROFISSIONAIS DE LABORATÓRIO CLÍNICO** não vacinados ou vacinados há menos de 15 dias, que tenham manipulado amostras clínicas de origem respiratória que contenham o vírus influenza sem uso adequado de epi.